

SUMMO ADSPIRANTE ARCHIATRO!
DISSERTATIO MEDICA

D E

G I B B E R E,

Quam,

DECRETO ET AUTORITATE
Inclyti & Gratosissimi Senatus Medici
in Illustri & florentissimâ

SERENISSIMORUM SAXONIÆ DUCUM
Academia SALANA,
SUB CLYPEO

Nobilissimi & Excellentissimi

N. GEORGII WOLFF-
GANGI WEDELII,

Med. Doct. ac Theoret. Professoris Publici,
Archiatři Saxonici, S. R. I. Naturæ Curiosorum Adjuncti,
& Academ. Recuperatorum in Italia Collegæ,

Domini Mæcenatis, Præceptoris ac studiorum suorum Pro-
motoris omni observantia honorisq; cultu etatem suspiciendi,
publicæ divæ artis Sectatorum censuræ submittit

ad diem Maji Anno M DC LXXXI.

in Auditorio Medicorum

FRIDERICUS Råseberg / BURGTORP. CELL.
AUTOR & RESPONDENS.

JENÆ, TYPIS VIDUÆ SAMUELIS KREBSIL



I. N. J.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.



Geometrix est non tantum lineas rectas, sed etiam curvas dimensionem suam subicere, & superficies gibbas æquè ac planas considerare. Illis insudare tanta gloria non est, cum uniformes sint & naturales; natura enim agit brevissimis, id est, lineis rectis. His verò incumbere, eas emetiri & ad rectas reducere, hoc opus, hic labor est. Cum enim sint naturæ quasi anomala & multis modis variari possint, major requiritur industria, majusque ingenii acumen, quod tamen maxima comitatur jucunditas.

Quanta, quæso, voluptas est in Saturno observare gibbum illud, quod sive annulum sive ansulas sive laterones dicere velis, nobis perinde est? Quæ jucunditas in lunâ cernere inæqualitates illas, quas montes vallesque esse volunt? Ut nunc taceam terræ gibbositates, quas Geometra practici summo cum labore, ferro atque igne solo æquare interdum laborat.

Æsculapii filios qui cum Geometris conferre intendit, à scopo forsitan non aberrat. Ii enim non duntaxat circa fabricam corporis humani erectam, sed & curvam versantur, eam reducendo, quantum in illis est, ad rectitudinem. Quod quidem magnis curis magnisque laboribus constat: arduum quippe veras ejus cognoscere causas, idoneis ob-

viam ire mediis, & in pristinum, quem natura intenderat, reducere statum.

At in arduis versari pulchrum est. Placuit igitur hâc vice gibbositates corporis humani paulò penitius perpendere, quod æternum Numen feliciter evenire jubeat.

CAPUT I.

Definitionem nominalem declarans.

NE in frontispicio statim propositi nostri mæandris implicemur, sed succincto & solido tramite procedamus, more recepto à vocis significatu initium facturi sumus. Nomina enim sunt εἰκόνες sive imagines rerum, quibus intellectui propositis ipsæ res, uti sunt, exprimuntur, & concipiuntur prout par est. Hinc eleganter *Plato in Gorgia*: ὅς ἄν τὰ ὀνόματα εἶδῃ, εἴσεται καὶ τὰ πράγματα, *nominum gnarus, gnarus rerum*. Consistit autem illa nominum cognitio in tribus: ETYMOLOGIA, HOMONYMIA, & SYNONYMIA.

Gibbus itaque, si ETYMOLOGIAM spectemus, nomen græcum est & latinitate donatum, descendit enim à κύπτειν *inflexere*, incurvare, à cujus præterito medio κέκυφα, abjecto augmento κε, & mutato α in ος, dicitur κυφός *incurvus*. Alii hoc nomen derivare allaborant ab ὑβός *curvus, inflexus*. Hinc ὑβωσις, ὑβωμα *curvamen*, tanquam ab ὑβόω *curvo*, quod illi, qui hoc affectu afficiuntur, non erecto sed magis depresso & inflexo incendant tergo; quæ tamen derivatio cum priori eadem est. Videri de hâc Philologiâ inprimis meretur *Pergamenus l. 6. aphor. comm. 46*. Ex quo ipso loco & rei ipsius fundamentis potissimum arguere licet, quidnam sentiendum sit quoad

HOMONYMIAM, magni momenti quæ est, ut ritè procedamus hinc in dicendis. Notandum enim est, sumi gibbi vocem *1. latissimè* pro omni convexo & extuberante, etiam naturali, unde notum est, non solum montes ab *Helmontio* & aliis dici gibbos terræ;

terræ; verum speciatim hepar dividi in partem *gibbam* & *simam*, convexam & cavam. Referri huc meretur, quod ipse *Cous* spinam scribit à sacro osse usque ad magnum verticulum *κυφὴν gibbosam* esse, *lib. de ossium naturâ c. 2. t. 6.* Quod repetit *lib. de articul. c. 41. t. 8.*

2. *Latè* & *impropriè* paulò gibbus notat omne vitium ossium circa ipsam cratem sive spinam, à statu recto in curvum abeuntium, & eminentiam inde consequentem, qualis tum in aliis ex consuetudine observatur, tum frequenter in senibus jam decrepitis, potissimum procerum corpus habentibus, quibus corpus præ siccitate aut imbecillitate nimiam in anteriora incurvescit ac inflectitur, quæ tamen potius curvitas, quàm gibbositas nominanda, ut quæ nullo pectoris aut spinæ vitio accadat.

3. *Strictè* magis gibbi dicuntur in universum, quibus luxatæ suoque loco dimotæ prominent spinæ vertebrae. Hæc autem luxatio varia est, & deprehendimus illius quatuor vel quinque potissimum annotari differentias, quas communi & recepto ordine recenserebimus. Una fit *extrorsum*, quum foras sive in posteriorem spinæ partem, vertebrae convertuntur, Græcis *κύφωσις* sive *κύρτωσις*, Latinis gibber, gibbositas dicta. Altera fit *introrsum*, quum in partem anteriorem vertebrae luxantur, ita ut in dorso sit cavitas, in pectore circa sternum præcipuè tumor, Græcis *λόγδωσις*, Latinis repanditas, recurvitas. Tertia ad spinæ *latera*, quando nempe vertebrae neque ante, neque retrò recurvantur, sed in obliquum sive ad latus declinant, Græcis *σκολίωσις*, Latinis obstipitas, divaricatio; est autem sic dicta, quod tortuosum velut lumbricum terræ reptantem referat spirarum similitudine. Refert etiam *Hieronymus Cardanus in Comm. de Causis, Signis & Locis morborum part. 3. § 56.* id quod etiam obtigit citanti id *M. A. Severino, l. de gibb. c. 1. p. 324.* & *D. D. Præsidi*, visam sibi puellam, flexâ ita spinâ, ut literam S referret. Quarta est, quum vertebrae in loco quidem suo manent, earundem tamen compages laxatur, cum æquali magis in sedendo incurvatione, quod in tenellis infantum corporibus speciatim visitur, non item in senibus, exceptis, quibus id vitium incuratum reman-

fit, qualem sartorem novit *D. D. Præses*, qui continuò incurvato & prono ferè corpore incedit, non aliter ac si aliquid amissum studio curioso semper quæreret. Græcis dicitur *σείσις*, Latinis *commotio* sive *concussio*, *quassatio* vertebrarum. De singulis his speciebus videri potest *Galenus l. 4. de loc. aff. c. 3. & comment. 3. de artic. t. 2.* Quinta est, quando tum vertebris dorsi, tum lato ossi pectoris, quod sternum dicitur, ut incurventur intus & extus, accidit, fœdaque corporis existat figura cum depressione colli & elevatione humerorum, atque exsiccatione coarum. Et ista corporis tortura vocatur ante & retrò gibbositas.

Ex quibus patet, tum singulas species probè discernendas, tum unamquamque illarum *strictissimâ* acceptione venire posse, cum primis verò, & magis καὶ ἐξοχὴν gibbi nomine venit, quando, quod frequentissimum est, extrorsum fit spinæ protuberantia, quâ de etiam in præsentiarum agemus potissimum, ita tamen ut reliquarum hæc ipsa sit velut quædam norma, juxta quam & illis opem ferre queamus.

Si *SYNONYMIAM* spectemus, variis hic affectus gaudet nominibus. Dicitur enim Græcis, præter dicta, κῦφσις, κῦβσις, κῦφωσις, κῦβωσις, κῦπτωσις, Latinis *gibbus*, *gibber*, *gibbositas*, *gibberositas*, & qui hoc affectu laborant, vocantur gibbi vel gibberosi. Germanis *der Höcker* / oder *der Buckel*. Et hæc de definitione nominali. Plura hæc de re scire si quis desiderat, Philologorum consulat oracula. Nos hæc vice de nomine non ulterius solliciti, progressum facimus sine ambagibus ad ipsam definitionem realem.

CAPUT II.

Definitionem explicans realem.

PRæcedente capite investigavimus Gibberis nomen, ejusdemque nominis significationem examinavimus, nunc ipsam quoque ejusdem definitionem producimus.

DEFINITUR autem Gibber, quod sit eminentia præter naturam, in dorso cum primis, vel thorace, cum deformitate & motus impedimentis, sine febre, dependens à spinæ dorsæ luxatione vel contorsione.

GENUS est eminentia seu tumor, in hoc enim gibberis essentia & formalis ratio consistit, ut, sensu teste, id deprehendatur, in omni propriè dicto gibbo esse extuberantiam, etiam quando cavitatem extrinsecus videatur exhibere. Omne siquidem convexum corpus suâ gaudet cavitare.

Qui verò per contorsionem spinæ morbum hunc definiunt, causalem definitionem offerunt, neque nobis hinc contrariantur. Patet hinc vitium esse structuræ tum in conformatione, quoad figuram, quandoquidem quæ recta vel recti æmula debebat esse spina dorsalis, & in longum magis excurrere, incurvatur, & actionem naturalem in motu lædit, ac symptomatum diversorum causa existit; tum in compositione, situ & connexione mutata.

DIFFERENTIAM SPECIFICAM constituunt reliqua definitionis verba, ut facile *γενικὸν τὸ εἶναι* tumoris pateat; esse nimirum tumorem ob partes solidas sede suâ dimotas. Ut enim ossa loco suo excidentia partes ad quas contorquentur, intumescere faciunt, illo verò loco, ubi exciderunt, cavitatem efformant, quod luxationis nomine in scholis Medicis venit; ita ad hujus latitudinem etiam gibbus pertinet, & simili contento solido est conspicuus.

Limitatum id speciatim fuit ad dorsum & thoracem, tanquam partes ad hunc affectum recipiendum quam maxime convenientes. Reliquæ enim partes corporis, præter dorsum, non facile & fermè in totum non sustinent gibbum, ut mox dicemus pluribus. Limitatum etiam ab adjunctis velut individuis comitibus primariis, deformitate & motus impedimentis, aliisque verbis, ut iis conjunctim spectatis facilis oriatur distinctio ab aliis tumorum generibus in dorso evenientibus, siquidem partibus ejus musculosis, seu mollibus in genere, affectis enormes sæpe tumores, imò nonnunquam scirrhosos quoque & rebelles,

rebelles, ibidem oriri & gestari experientia rerum magistra loquitur.

CAPUT III.

Subiectum exhibet.

SEde morbi prius bene perspectâ atque perpensâ, felicius hinc sine ejus notitiam & curationem pervenire quemque posse, monet *Celsus l. 4. de re medic. c. 1.* Cujus monitum ut nos quoque sequamur, in gibberis subiectum seu partem affectam jam inquiramus.

SUBJECTUM PRINCIPALE gibberis sunt vertebræ spinæ dorsalis, illas enim præcipuè affici sensu & ratione patet; **ADÆQUATUM** verò constituunt vicinæ & connexæ cum iisdem partes ossæ aliæ, thorax, sternum, costæ, scapulæ. Neque enim nisi gradibus læsionis & speciali loco differunt tumores circa scapulas, dorsum, humeros gibbosi. **REMOTIUS** subiectum est totum hinc corpus. Unde ossium horum consideratio, quomodo affici possint, multum ad investigationem causarum penitiolem faciet.

Certum enim est 1. effatum generale Hippocraticum, præcipuè huic parti conveniens, *l. de ossium naturâ c. 17. t. 1. § 2.* (qui de venis in edit. *Linden.* inscribitur) τὰ ὀστέα τῷ σώματι στασι, καὶ ὀρθότητι, καὶ εὐθείᾳ παρέχειν, τὰ δὲ νεῦρα κάμψιν καὶ ἔκτασιν, καὶ ἔκτασιν, ossa corpori stabilitatem, & rectitudinem, ac formam exhibere, nervos flexionem & contractionem ac extensionem.

2. Constat verò per Anatomicum, spinam non uno osse continuo gaudere, sed pluribus, quæ spondyli sive vertebræ audiunt, à vertendo dictæ, quod harum beneficio spina in omnia motus genera aptari & verti possit, flectendo corpus antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum.

3. Vertebrae hasce sibi invicem superponi, foventes in centro suo medullam à cerebro prolongatam, ut velut columna quædam sit, mobilis tamen, ut & conjunctis iis corporis sustineri moles queat, & iisdem conjunctim & æqualiter inflexis & curvatis motus peragi.

4. Ipsam

4. Ipsam spinam secundum longitudinem ἰσσοκόλιον *rect-obliquam*, & in quatuor velut sectiones expositam esse: collum, dorsum, lumbos & os sacrum. Ex his verò dorsi vertebræ, quod anticâ parte thoracem constituit, frequentissimè, hinc lumbi afficiuntur cum primis & gibbum pariunt.

5. Ut motus flexionis & extensionis possit confici, γέγγλυμῶδες ἔς σπονδυλᾶς, *copulari sibi invicem vertebrae per γέγγλυμον* & motum conspicuum edere; circumfusas cartilagine insigni utrisque extremis, quibus se excipiunt; connexas præter συγχόνδεωσιν nexu firmissimo per ligamenta & vincula crassa valida ac dura; implicari processibus, & præcipuè vinculum membranis validis intextum universam spinam extrinsecus obvolvere, à quo robur & firmitudinem acquirit. Connexæ sunt vertebræ (ut loquamur cum B. *Rolfincio* *dissert. anat. l. 2. c. 35. p. 378.*) durâ extrinsecus membranâ: intus verò ligamento membranoso, duro & robusto, à summâ cervicis vertebrâ ad os sacrum producto. Elegans connexionis hujus exemplum per speciale membraneum vinculum, à supremâ contignatione spinæ protensum, curiosâ speculatione videri potest in halecibus, modò certa ἐγχειρησις adhibeatur, ut à carnibus separatum oculis pateat, ad cujus flexionem & spinæ cratem curvari oportet. Id verò non nisi in coctis apparet. Neque obstat, non perfectum attribuere alios ossibus hisce γέγγλυμον, quod non fiat hoc loco mutua duorum ossium insertio, sed moveri potius eadem per ἀρθρώδια. Sufficit enim concedendum omninò esse motum quendam & articulationem, ac eundem in finem & vertebrae sibi invicem incumbere, flecti aptas, & articulari earundem apophyses ascendentes & descendentes inter se.

6. Speciatim etiam vertebrae dorsi, sive thoracicas, costas excipere, firmare, & hinc inde ad vicinas partes nervos emitte, ubi vis annexas inflectentibus musculis.

7. Quâ viscera spectant, vertebrae rotundas esse, cum substantiâ tenerâ magis & rarâ; extrorsum verò processibus eminere, per σύμφυσιν connexis, & æquali positu rectitudinem

proportionatam servantibus. De quibus evolvi præter alios possunt *Archangel. Piccolhom. prælect. Anat. l. 8. lect. 8. p. 367. seqq. Rolfinc. l. c. c. 7. § 37.*

Ex hisce, ut alia mittamus, clarum esse potest, illi parti principaliter morbum esse assignandū, ubi læsio contigit, & consequens vitiosa conformatio. Fitq; id ipsum modò per essentiam, proprio & domestico vitio, quod frequentius est, modò per consensum aliunde morbo inducto, ita tamen, ut successu temporis essentialis labes fiat.

Ut ut verò sint, qui subiectum hoc latius extendere velint, & præter spinam dorsalem gibbum pati etiam alias partes extra hoc clima medium, uti *Severinus l. de recond. abscess. nat. manus & pedes quoq; huc refert*, cum hæ partes æquè distorqueri queant, adducitque exemplum in adolescente, quod videri potest *l. c. p. m. 342.* Propriè tamen loquendo reliquæ dictæ partes corporis sustinere quidem possunt luxationem perfectam vel imperfectam, curvitatem, eminentiam, at gibbum non item, aliam enim habent conformationem, aliam articulationem. Gibbus ergò solùm competit spinæ & præcipuè quidem, quoad dorsum frequentissimè, cum annexis thoraci partibus, hinc & lumbos.

CAPUT IV.

Causam immediatam & mediatam proximiores explicat.

Cum itaque plurimum referat causam nosse, & in morbis his conformationis ad oculum pateat, non cognitam eandem nec auferri posse, meritò ad hujus inquisitionem provehimur.

CAUSA IMMEDIATA est vertebrarum spinæ dorsalis luxatio, laxatio, subluxatio vel διαστροφὴ *distorsio*, seu *contorsio* nominata *Hippocrati l. de art. c. 45. t. 5. ut μετάστasis τῶν σπονδύλων Galeno l. 4. de loc. aff. c. 3.* quibus innuitur articulationem earundem esse læsam, συγχόνδρωσιν, συνδέσμων & συσάγκων non pristino naturali deprehendi in statu, sed vel laxata vincula, quod in σείσθι potissimum visitur, vel luxatos penitus verticillos. Hisce enim luxatis & non maturè repositis, statim aliqua eminentia, aliqua protuberantia conspicitur. No-

Notari verò meretur, luxationem hîc accipi paulò latius non pro dislocatione omninò perfectâ, violentâ, & simul ac semel contingente, quæ maiorem vim causarum externarum sequitur, &, si vera sit, ob spinalis medullæ compressionem, præviâ communiter paralyfi nervos inde accipientium partium, & aliis symptomatibus, ut plurimum lethalis esse consuevit, vel aliâ facie saltim visenda; quâ de videri potest *Celsus l. 8. c. 14. p. 580.* sed imperfectâ, minus respectivè violentâ, & successivâ, unde è sede suâ sensim sensimque dimotis verticulis nutritiva & auxiliatrix vis à limite suo aberrat.

CAUSARUM MEDIATARUM PROXIMIORUM vicem sustinent quæcunque ἐλκεῖν τὰ νεύρα ἢ σπλάγνα trahere vel distendere nervosa corpora vertebrarum possunt, quas commodè in externas & internas dividere licet. INTERNÆ, quoad *essentiam*, sunt vel *vaporosæ*, vel *humorosæ*. Vapores quidem minus concurrunt, quod videantur debiliores ex ordine suo dimovendis vertebra; si tamen impetum horum respiciamus, etiam suo loco aliquid conferre poterunt, exemplo illorum, qui juxta *6. aphor. 46.* ex tussi & asthma gibri evadunt, quatenus coactivâ expansione thoracis in anxiam illâ respiratione etiam vertebra in dispositis extorsum coguntur cedere, successivè impressâ debilitatis notâ, licet magis videatur loqui aphorismus de asthma & tussi, tubercula latitantia comitante.

Hinc si retento anhelitu comprimatur abdomen, sæpe manifestus hujus rei sensus in dorso se exerit.

HUMORES verò potissimam absolvunt paginam, si peccent, quoad *essentiam*, serosi cum primis, luxare & laxare præ reliquis apti nati. Quoad *essendi modum* verò considerati, si delinquant quantitate, qualitate, & motu.

Quantitate, partim in *excessu*, tum primariò interdû, tum secundariò & dispositivè, facilitantes dimotionem illam, si malè sint dispositi, si humores in articulis & juncturis acerventur, qui articulationis ipsius ligamenta primum madefaciunt, dein laxiora reddunt & tandem ob copiam suam os ipsum è sede suâ protrudunt; partim in *defectu*, si sufficiens humiditas desit, ipsaque liga-

menta velut magis nuda, minusque investita partibus carnosiss & adiposis contractioni facilius auscultent.

Qualitate peccant, si vel alimentarem blandam, roscidam & oleosam deponant naturam, & acidis vel alcalinis particulis scateant, unde aridius corpus confurgit, & tenerius, vel ichorescant conceptâ facili labe ab extravasatione, vel *σύνδεσμος*.

Maximè ergò accusandus venit eorundem *motus*, tum generationis, tum localis. Generantur sæpe IN PARTE AFFECTA ipsâ per *συναθροισμὸν* seu congestionem paulatinam, inductam ob debilitatem nativam vel acquisitam, ob intemperiem humidiores, vel errores externos, unde non legitimè nutriuntur partes teneræ, molles, cartilaginossæ, nec debitam acquirere possunt consistentiam.

Idque ut paulatim magis fit, ita majori cum *ἐκπύρεσι* & impetu, si EXTRA LOCUM AFFECTUM generati vitiosi humores, seu latex vitiatum ad spinalem medullam ejusque vertebrae per *πνευματισμὸν* appellat, unde considerabimus partem mandantem, recipientem, vias & modum.

Partis mandantis vicem obtinet totum aliquando corpus, ob cacochymiam serosam, acetosam, nervisque & ossibus minus benignam, unde ut ex hoc fonte seri vitiatum *παλίτις* sæpe confurgit; ita speciatim quoque hæc gibbum conjunctum frequenter habet. Plethoricos verò minus videas gibbosos, quod in iis torosiores muscoli minus læsionibus sint obnoxii. Interdum & viscerum *δυσκρεσίων* concurrunt particulares, ventriculi, hepatis, lienis, cerebri, depuratione & cohobatione sanguinis minus ritè peractâ, unde promptus fit laticis decubitus, & spiritus animales minus vegeti in nervis decurrunt.

Pars recipiens est spina dorsalis, sustinendo corpori dicata. Cum ergò pars hæc sit spermatica, à sero incrementum sibi capiens, mollis naturâ suâ & frigidior, adeoque ibi jam tum glutinosus humor existat, si huic ipsi alius & quidem in excessu peccans superveniat, haud difficulter vitium & tuberculum aliquod excitari potest.

Via sunt arteriæ advehendo, venæ & vasa lymphatica non recipiendo superfluum.

Modus fit ὡς καὶ ἔλξῃ. Pellit continuò spirituosì sanguinis & succedentium sibi undarum impetus; obice ergò posito, sive concepto calore pori magis rarefiant, seu dolore velut spina infigatur, αἴσι, prompta est; verbo, circulatione sanguinis vel lymphæ impeditâ, hoc vel illo speciali loco, promptus affluxus & πνεύματος consurgit, hujusq; hinc effectus, tubercula seu abscessus. Sanè summi Medicorum proceres, *Hippocrates & Galenus*, binas has præcipuas & unas ferè causas gibberis laudant, quas verbis *Galenì* proferemus ex 6. *aph. comm.* 46. ὑβῆται ῥαχίς, inquit, ὅτε μὲν καὶ Διὰ τινὰ πληγὴν ἢ κατὰ πῦρ. ὑβῆται δὲ καὶ Διὰ τινὰ Φύματα σκληρὰ συσπέντα καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν χώραν. Gibbositas spinæ fit aliquando propter ICTUM aut casum, fit etiam propter quædam TUBERCULA dura, quæ in parte anteriore consistunt. Et paulò post asserit, omnes qui sponte seu citra externam aliquam causam, sine ictu vel casu, gibbosi fiunt, propter dura & concoqui difficilia tubercula tales fieri, ὅτι Φύματα σκληρὰ ἢ δυσπέραστα ποιεῖται γίνεσθαι. Quæ ipsa mens quoque est, imò verba eadem, divini senis *lib. de artic. c. 37. t. II.* nisi quod ἀπέπλων loco δυσπέρατων meminit, additque plerisque propter tales συσπενσεις, collectiones, morbum fieri.

Quomodo verò à tuberculis hisce tractio, tensio & consequenter contorsio vertebrarum fiat, indeque modò introrsum, si unâ saltim parte resideant, modò extrorsum, si utrinque, modò laterorsum vertebrarum exturbatio contingat, pluribus *l. c. it. l. 4. c. 3. de loc. aff. & comm. 3. l. de artic. t. 2.* *Galenus* explanat elegantissimè, ibidem videndus. Suffecerit nobis, exemplo tumorum extrinsecus oculis occurrentium idem concipi & illustrari posse. Constat enim v. g. in colli tumoribus inflammatoriis, eâ, quâ residet malum parte, à tensione fibrarum inæquali & laterali magis inflecti caput & curvari velut ad latus, & si in oppositum reclinetur, dolorem mirum quantū augeri, quod hoc pacto major fiat tensio & consequenter dolor; ab æquali verò & majori in oppositum magis verti. Eadem ratio est, si tumor in ingvine confederit, aliisque locis, ubi flexura imprimis opus est. Tacemus exemplum mechanicum corporum flexibilium, bacil-

lorum recentium, & calamorum scripteriorum, itidem *Galeno* & ex eo *Severino* laudatum. Ut in aliis quoque luxationum generibus, quando tendines & ligamenta extenduntur nimis, laxantur, flaccidiora evadunt, & hinc dimittunt ex acetabulo suo ossa; ita & in affectu hoc nostro plurimum ipsi ligamentorum & nervorum vitio adscribendum est. Factâ horum tensione, necessum est vertebrae etiam unâ nunc dextrorsum, nunc sinistrorsum, alias introrsum, alias extrorsum rapi, sicque suâ sede dimoveri & luxari. Et hâc ratione tubercula quicquid præstant, quod non exiguum sed plurimum est, præstant vitium affricando illis corporibus, quibus vertebræ alligantur.

Hinc cum molem superpositam ferre non sustineant vertebræ, non firmatæ nec ferruminatæ, uti prius, sensim fatiscunt, cedunt, & anomalias in figurâ patiuntur, dimotæ magis magisque e loco suo. Pro varietate ergo loci, ex quo dicto modo ligamentis & vertebris dislocationis intentatur vitium, etiam modò hîc, modò illic, idque iterum variè, conspicuum concitat malum confectarium. Confer *Mayow. l. de rhachit. p. 124.*

Præter internas hæc proximiores etiam CAUSA EXTERNA considerata venit, cujus vicem obire potest omne illud, quod corpus grave durumque quassat, allidit, percutit, qualia sunt ictus, casus violentus in scapulas vel coxas, nimix compressiones, inflexio nimia & similes causæ violentæ. αἱ κυφώσεις αἱ ἐκ τοῖσιν πτώμασιν ὡς ὅτι τὸ πολὺ γίνονται, ἢ ἢ τοῖσιν ἰσχυροῖσιν ἐρεΐσῃ, ἢ ὅτι τὰς ὠμὸς πέσῃ. *Gibbositates ex casibus contingentes plerique fiunt; si aut in costas innitatur, ac impingat, aut in humeros cadat, inquit Cous l. c. c. 45. t. 2.* Quò pertinet etiam nutricum imprudentia, quando infantes fasciis nimis arctè aut inæqualiter constringunt; (quod *Hildanus* in multis observavit, ob strictiorem scil. involutionem gibbum infantibus frequenter accidere: siquidem ossa adhuc tenera, mollia, cærea quasi & cartilaginosa faciliè retorquentur, extraque sedem naturalem reprimuntur, quæ dein paulatim excrescentia indurescunt) aut in brachiis gestant prius, quàm spina tam firmata est, ut erecti sedere possint; aut si, dum infantes e cunis elevant, dorsum manu alterâ non fulciunt.

ciunt. Huc referenda est & vestimentorum nimia constrictio & angustia, dum puellas stultæ matres junceo corpore esse student, tenellâ enim ista ætate mollia nimium & mucosa spinæ dorsif ligamenta eam recto & constanti casu continere nequeunt, sed sequacia nimium ejus vertebrae in interiorem, exteriorem aut lateralem partem proruere & projicere se facile permittunt.

Est & ex causis externis memoranda consuetudo, corpus quoquoeversum inflectendi atque inflexum continendi. Quemadmodum enim virgultis & viridibus lignis pondere pressis, assidueque contortis; ita & dorso nostri corporis curvitas accidit sub opificiis diversarum artium & sub institutis vitæ diversis. Ad hanc consuetudinem referendus videtur & indecorus juvenilium & mollium adhuc corporum situs & positus in stando, ambulando, saltando, gesticulando, aut simile quid agendo, de quibus omnibus plura legi merentur apud *Severin. l. c. c. 3. p. 327.*

CAPUT V.

Causas mediatas remotiores exponit.

PRædictis causarum generibus obstruuntur tum *αὐτογενεῖς* seu antecedentes, tum *αὐτοπαρὰγενεῖς* seu occasionales, quas sub naturalium, nonnaturalium & præternaturalium notatione complectemur.

Ex NATURALIUM causarum censu est DISPOSITIO corporum, si non hæreditaria, tamen individualis, quâ alii præ aliis procliviores sunt ad hujus mali fomitem recipiendum, nam omne agens requirit patiens dispositum ad agentis energiam recipiendam.

Quoad DISPOSITIONEM HÆREDITARIAM, licet gibbus non sit morbus æquè seminalis propriè sic dictus, nihilominus tamen multum ad illum producendum conferre valet vitiosa in utero conformatio. Hæc autem facile contingere potest ibidem

dem vel interno humorum vitio à matre traductorum, tum quoque, ut colligere non ineptum aliquando est, ex situ fœtus mutato, & exantlatis gravioribus in partu angustis, præcipuè in primiparis. Hinc rectè *Helmont. libro Retenta inscripto p. 497.* Ad continentis morbos, ait, spectant quoque spontaneæ excrescentiæ, gibbositates, luxationes & exarthroses; Quæ quia innatam roboris inæqualitatem sequuntur, semini parentum plerumque vel nutricum defectibus acceptum ferunt.

TEMPERAMENTUM frigidum & humidum, ut & frigidum & siccum maximoperè ad hanc proclives reddit labem. Nec solum totius temperamentum corporis, sed etiam & quidem præcipuè reliquorum corporis nostri viscerum attendendum venit. Ventriculus si non rectè dispositus, non rectè concoquit cibum, sed corrumpit, ex quo haud laudabilis fit sanguis, sed cruditatibus cumulatur corpus, quod vitium coctionis primæ non corrigitur in secundâ, multò minus in tertiâ. Cor si non benè sese habet, non bonus elaboratur sanguis, & mala fit nutritio, cor enim est primaria sanguinis officina.

ÆTAS unice huc facit & præ aliis quadrat infantilis & puerilis 3. a. 26. Illa quidem, quando considerare incipiunt, σείων frequentius patitur, hinc & κύρτωσις, quale exemplum XVII. mensium infantis recenset *Theodos. ep. 42. p. 250.* & similia in praxi sæpe occurrunt; hæc quando jam ambulare coeperunt, anno cum primis quarto, quinto & sequentibus, donec ex ephebis excesserint. Rarius paulò ultra septimum annum provecti gibbosi, ab internâ maximè causâ, redditi observantur, vel saltem quò serius malum hinc impetit corpus, eò minus incrementum vitiat.

In primis verò id fit, si accedat HABITUS corporis gracilior & textura tenerior ac serosior, unde spina debilior, ex cartilaginibus magis quàm ossibus adhuc constans, pro sustentandâ capitis mole fulcrum minus firmum præbet, promptèque, si præsertim ictus vel casus superveniat, graviori oneri cedit, & rectitudinem suam non sine insigni costarum sternique contorsione amittit. Hinc *Hippocrates lib. de articul. c. 6.* carnosus minus contingere luxationes, scribit, & si fiant, difficilior restitui, contrarium verò

λεπτοτέροις καὶ ἀσαρκότεροις, tenuioribus & magis excarnibus accidere.

Juvenilis verò, crescendi terminum supergressa, ut & media ac consistens ætas libera ab hoc malo ferè est, nec hujus insultum facilè experiri cogitur, si quidem de gibbositate propriè dictâ sermo sit. Talis enim incurvatio æqualis magis etiam in ætate senili & decrepitâ visitur, seu quod vires sint debiliores, unde imbecillitas corporis in genere multum huc confert, seu nimis exsiccata vincula & contracta, unde minus onus corporis sustinere norunt, quin spina nutet & incurvetur; hæc autem imbecillitas fit partim ex copiâ pravorum humorum, partim ex penuriâ succi alimentitii. Sin illud accadat, id magis extraordinariè & à causâ graviore fieri putandum est, uti exemplum de coquo recenset lib. 5. epidem. c. 22. §. 4. Hippocrates, de quo inferius agemus mox.

Quoad SEXUM, apprehendit hoc malum frequentius fœminas, & quidem magis urbanas præ ruricolis, quàm viros, fœminæ enim majorem præ viris habent mollitiem, teneritudinem & serositatem, sive fœminæ serosiores sunt viris, unde ipsarum corpora deprehenduntur laxiora, & citius adolescunt quàm viri.

Nec CAUSÆ NON NATURALES suis destituuntur viribus penitus ad gibbositatem juvandam & producendam.

AER, qui inevitabile & perpetuum corporis velut integumentum est, crebris suis mutationibus cum partium anni, tum ventorum vaporumque putridorum admistorum respectu, in alterando saltem sero maximarum est virium, idque tantò magis, quantò corpora sunt teneriora. Sic frigidus & humidus huc facit, quatenus calorem nativum obtundit, humoresque in corpore auget. Calidior verò æstivus, ob exsiccationem majorem.

CIBUS & POTUS si peccent substantiâ, quantitate & qualitate multum ad hujus affectus γένεσιν conferre queunt. Sic commune puerorum vitium ἀδὸν Quayia corpus vitiosis replere succis apta nata est, imprimis si assumantur, quæ minus
C lauda-

laudabile præbent nutrimentum, sed tantum generant prævos humores, ut sunt lacticia, piscium largior esus, fructus quoque nimis frigidi & humidi, *ωγαῖοι*, ut cerasa, pruna cerea, melones, cucumeres, fungi & similia terræ ulcera, aliaque pituitam cumulantia. Tacemus aquas crudiores, nivofas, usu suo continuato multum conferentes. Cerevisiæ minus defecata ex aquis palustribus & putridis cocta nec lupulo benè condita usus huc facit, vini item intempestivus usus tenellis corporibus infantum summè nocet, efferando humores & exsiccando nimis.

MORUS summa vis est ad distorquenda ossa tenella, quocunque demum modo excedat, sive tendatur nimis corpus, seu contrahatur, seu tensum & contractum teneatur, unde ligamenta articulorum facilè fatiscunt, & ex ordine dimoventur.

Nec **QUIES** omninò culpā vacat, cum videamus etiam adultos sedendo & incurvando dorsum hinc positum corporis obstipum reportare. Multò magis in infantibus id valet, quando erecto corpore superiori immaturè desidere coguntur, plusque ipsis, ut solet, virium tribuitur, quàm sustinere corpus queat.

Par ratio est **SOMNI** & **VIGILIARUM** in accumulandis vel dissipandis humoribus. **EXCRETA** & **RETENTA** magni etiam sunt momenti non solum quando crassiora excrementa per alvum & urinam reddenda restitant, unde vitiosi humores cumulantur, & exinde semina pro morbo hoc excludendo sparguntur in reliquum corpus; verum etiam & potissimum tenuia per habitum corporis exhalari solita. Hinc retentis humoribus & transpiratione prohibita facillimè febres & tubercula interna enasci solent. Sin nimis sudoribus fatigentur succosa corpora, & depauperetur serum alimentarium ultra sphæram ætatis, tum nutrimenti tum augmenti defectus oboriuntur necessario.

Tandem **ANIMI PATHEMATATA** ad hunc affectum producendum suā etiam non carent virtute, quo loco saltim memorabimus iram, si, contra *Apostoli* monitum, irritentur ad excandescentiam infantes & pueri, atque inde in inconditos ploratus,

tus, cum pectoris singultuosâ quasi concussione, adigantur, facile noxâ ad ossium & ligamentorum stimulum redundante.

Nec CAUSÆ PRÆTERNATURALES silentio sunt prætereundæ. Intemperies & humida & sicca hîc occurrit accusanda; illa quatenus ligamenta vertebrarum laxat, distendit & tandem è suo loco dimovet; hæc, quatenus ariditate vincula vertebrarum spinæ in anteriora protrahuntur, sicut in ardente potissimum febre visitur.

Pertinet huc exemplum ab Hippocrate visum, l. c. τὸ μα-
γεῖω, inquit, ἐν ἀκάνθῳ τὸ κύφωμα ἐν Φρενίτιδι ἐγένετο.
Coquo in spina gibbositas facta est ex phrenitide.

Quod angina ad gibbum facere possit, legi meretur *Cons. l. 2. epid. s. 2. t. 66. seqq.* quod dolores, *idem l. de artic. c. 45. t. 1.* Gibbositatem ex longo ventris dolore observavit *Epiph. Ferdinand. hist. 84. p. 279.* seu ob conjunctam frequentem, longam & diurnam ventris compressionem, & consequentem vertebrarum dimotionem, sive decubitum humorum ad spinam, uti notum est πάρεσιν aliàs ex colicâ non rarò oboriri, & tantò quidem magis, quia tumore hoc apparente dolor evanuit.

A palpitatione cordis costas è suo loco motas esse post *Fernelium l. 5. pathol. c. 12.* observavit *Horstius l. 3. obs. 17. p. 139.*

Ex dysentericiâ prægressâ gibbum factum in puello quinque annorum notavit *D. D. Præses*, ubi gravissimo malo succis vitalibus depauperatis cutis vix ossibus hæsit, & hinc vertebræ ex sede suâ sensim excreverunt. De aliis externis injuriis jam satis diximus superius, hæ verò frequentissima sunt causa.

Si RES SUPERNATURALES addere lubeat, certum est, per veneficia quoque & incantationes ut contracturas & convulsiones horrendas, ita quoque gibbos oboriri posse. Neque opus fuerit immediato damno, satis est per diabolicas artes casus, ictusque in partes osseas hæce & consequenter gibbum concitari posse. Aliàs verò ope Diaboli in ἀντοχειῖς talia contingere luxationum stupenda exempla notum est, & tale refert *Hildanus Centur. 5. Observat. 68. pag. 458.*

CAPUT VI.

Differentias perpendit.

Cognitis nunc causis, differentias ut proponamus, ordo postulat. Præter differentias itaque gibberis essentielles, quas repetere denuò non opus est, alias quoque considerare operæ pretium fuerit, quandoquidem hæ & diagnosin & prognosin, adeoque ipsam quoque curationem limitant & modificant.

Ratione **GENERIS**, alius gibbus est major, alius minor, unde & minor vel major deformitas; alius in acutum magis, alius in orbem magis versis vertebris.

Refertur huc, & nominatim ad *σείων*, etiam à *Sennerto l. 2. p. 2. prax. c. 21. p. 294.* affectus, quem Germani das *Behthun* appellant, à tensione membranarum & ligamentorum circa vertebrae in eodem ordu.

Ratione **SUBJECTI**, gibbus alius est in cervice, alius in thorace; alius supra, alius infra septum; alius in lumbis. Quemadmodum enim vertebrae sunt inter se distinctæ pro vario situ, quem in spina obtinent; ita gibbositas, quæ vertebrarum spinæ vitium est, quoque variat, pro earundem inductâ læsione, unde & diversitas symptomatum, quæ singulæ secum invehunt.

Ratione **CAUSARUM** tot sunt differentiæ, quot causæ, ex recensitis petendæ. Alius fit à causâ internâ, alius ab externâ; alius à repletionem, alius ab inanitionem; alius ex intemperie frigidâ & humidâ, alius ex intemperie calidâ & siccâ. Alius ab humorum influxu citiori, & inflammationem; alius à congestionem; alius cum fracturâ, cum ulcere, alius sine his.

His omnibus missis, advertimus vertebrae interioris rarissimè, exterioris frequentissimè, ad latus verò frequenter obliquari.

CAPUT VII.

Signa diagnostica proponit.

Sillis in morbis diagnosi opus est, sanè in gibbosis quàm maxime id valet; adeoque & hic, quæ *Coi* verba sunt, solus
is,

is, qui signorum horum cognitionem habuerit, ritè curationem aggreditur.

Duplicia verò SIGNA DIAGNOSTICA sunt RATIONE GENERIS, alia *imminentis*, alia *presentis*. Indicia incipientis gibbositatis, verba sunt *Rolfinc. epit. affect. part. l. 4. c. 2. pag. 350.* adeò interdum latent musculosis in spatiis occultata, ut etiam peritos fugiant. Augescens omnium exposita est oculis. Illa verò metuere oportet, quando ex jam dicendis minori gradu se *Φαινόμενα* exhibeant.

Spectabimus ergò ordine fontes consuetos, ut demonstrativè hinc concludere liceat, gibbum adesse, vel non.

EX ESSENTIALITER INHÆRENTIBUS, quæ quidem hoc in casu ipsos in sensus incurrunt, vitium adest in situ, in figurâ, & rectitudine, cum magnitudine auctâ, quoad locum affectum, ita ut non instar carinæ in navi decurrat, & *ὀρθότης* ac *εὐκλεία* præbeat spina dorsalis, sed modò extuberent ante & retrò vertebræ, ut in gibbere propriè dicto, modò velut excavato dorso intrò spectent, ut in *λογδῶσι*, modò sinuentur in latus, modò viminis in modum incurventur universæ, ut in reliquis speciebus. Juxtim verò reliquæ quoque partes figuram viciatam exhibent, sternum magis acuminatur, scapulæ, costæ magis protuberant, prout varia præcessit læsio, caput thoraci arctius insidet, breviori collo.

EX ESSENTIALITER CONSEQUENTIBUS symptomata gibbum patefaciunt varii generis; in *actionibus læsis animalibus* cum primis motus imminutio evidens fit. Neque enim *ὀρθοστάδιοι* stricto sensu esse possunt, stare diu nequeunt, neque sedere, nisi corpus vel mentum fulciatur manu, donec confirmato vitio aliud consuetudo & adultior ætas induxerint. Inflecti dorsum renuit versus inferiora, ut si terram contingere manu velint demissis poplitibus id facere cogantur. In sternutando molestiam sentiunt, magis ob angustiam concussis partibus. In *vitalibus* pulsus celerior, respiratio difficilis, defluxiones frequentes, asthma & tussis succedunt, idque tantò magis, quò magis angustatur spatium thoracis, & vice versâ. Cum enim in thorace cor & pulmo resideant, horum actiones potissimum lædi necessum est. Variant

ergò hæc ratione loci, seu partis affectæ specialis, si enim infra septum transversum malum contingat, minus hæc observantur. In *naturalibus actionibus* nutritio & auctio mirum quantum fatiscunt, corporis succedit macies & incrementi penuria, ut ad solitam proceritatem non extendatur corpus æqualiter, neque incrementum sumant unà carnes. Haurire hæc latius ex fontibus Hippocraticis operæ pretium est, ex quibus quippe alii ferè hæc sua fecêre. Quibus, *inquit divinus senex*, gibba fit spina, dum pueri sunt, prius, quàm corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus juxta spinam *ἔνδον καὶ ἀπὸ τοῦ στήθους* coaugeri non amat, sed crura quidem ac manus perficiuntur, illæ verò partes defectuosiores fiunt. Et quibus supra septum transversum gibbositas est, his & costæ in amplitudine augeri non solent, sed in anteriorem partem, & pectus acutum fit, sed non latum, ipsique & difficulter spirant & stridulam faucium asperitatem habent. *l. de artic. c. 37. t. 4 seqq.* Causæ maciei potissimum debentur cum rectitudini vitiata, unde in latum magis quàm in longum fit extensio; tum sero nutritibili magis rarefacto. Aliæ videri possunt apud *Helmont. l. vita brevis p. 588. Barthol. de lact. thorac. c. 14. p. 107.*

Notatu dignum verò est & hoc phænomenon peculiare in gibbosis, quoad thoracem occurrens, quod nempe abdomen superiori parte circa epigastrium contrahatur, & cincturam quasi patiatur, durante expirationis actu, quod sine dubio contingit ob diaphragmatis vitiatum unà situm & tractionem. Constat enim per Anatomen, testante *Galeno l. 4. de loc. aff. c. 3.* septi transversi nervos sub quartâ ac quintâ vertebrâ emergere. His igitur patientibus necessariò motus hujus, uti decet, expediri non potest, sed magis versus superiora trahitur, unde non solâ angustationis culpâ libera spiratio impeditur, verùm etiam plurimum, ut ad respirationem aliàs, confert diaphragmatis consensus hic, ut & musculorum pectoralium & intercostalium ipsorum.

Quandoque & paralyfis succedit, sed rarius, quale exemplum notavit *D.D. Praeses Ann. 2. Ephemer. Germ. observ. 230. p. 333. & Hildan. cent. 5. obs. 7.* eâ tamen differentiâ, quod posteriori casu dolor

dolor & affluxus præcesserint, à cuius decubitu & μεταστάσι successit crurum resolutio; in priori non item. Licet enim non subitanea æquè vertebrarum dislocatio in gibbere fiat, ipsa tamen paulatim hæc & pedetentim facta nonnunquam obstructions pororum nerveorum causari potest.

In excretis sæpe tentantur hæmorrhagiâ narium, quod & angustiori spatio decurrere cogatur sanguis, & ob respirationem difficiliorem moveatur velocius, unde quocunque errore externo, vel aliunde rarefactione majori inductâ, promptè stillant nares, illic exitum affectante sanguine.

CAUSÆ PRÆGRESSÆ quoque patefaciunt affectum, siue externæ, si præcesserit ictus, lapsus, contorsio violenta, vel alia injuria evidens; siue internæ, quando nil tale deprehendi potest, dolores, pectoris angustia, febris & similia.

Hæc ipsa etiam ad SIGNA CAUSARUM lustranda faciunt. Si læsæ fuerint æqualiter magis vertebræ, quoad ἀρμονίαν, per quam sibi connectuntur secundum corpora, mediante cartilagine non paucâ, fit σείσις, seu incurvatio æqualis; si versus interiora fiat extensio, fit λόρδωσις; si versus exteriora, quâ processus, ubi per σύμφυσιν fit connexio, fit gibbus, & κύρτωσις κατ' ἐξοχήν dicta. Par ratio est costarum, scapularum, versus exteriora protensarum; sin ad alterutrum latus, σκολίωσις.

NEC SIMILITUDO abludit, sed hæc omnia confirmat magis, siue ægri spina cum alterius sani hominis comparetur, siue ad priorem sanum statum ipsiusmet cogitatione recuratur.

SIGNA SUBJECTI specialis ex visu & sensu patent. Si superiori parte malum hæreat, caput humeris velut contiguum, cervix & collum brevius deprehenduntur, humeri non depressi, sed velut alati; in inferiori non item.

CAPUT VIII.

De Signis prognosticis.

IN morbis etiam externis hisce multum interest, ut munimentum famæ Medici prognosis observetur, ne vel temerario promisso

misso desperato malo promittatur salus, vel prognostico relinquatur, cui adhuc mederilicuerit.

EVENTUS prædictionem quod concernit, illa in SALUTIS & MORTIS, curationis item possibilis vel impossibilis signa concinnè dividi potest. Quoad *priorem* quidem distingvendum meritò & hoc loco est inter luxationem perfectam ac repentinam, quæ à solo casu externo graviore accidere potest; & imperfectam, successivam, propulsoriam. Illa ut vel lethalis est, vel satis gravis; quando scil. angulosa sit spinalis medullæ luxatio, cum non paulatim sed affatim, perinde ac si frangeretur, pars aliqua curvatur, subjectas partes omnes lædi necesse est; paulatim verò factâ luxatione atque in orbem magis, nihil notatu dignum patiuntur partes, teste *Galeno l. 4. de loc. affect. c. 3.* Ita secundariò magis huc spectat. In gibbere verò videnda in se lethalis minus est, licet satis molesta, nam juxta *Hippocratem l. c. de artic. c. 45. t. 5.* spinalis medulla ejusmodi distorsiones facilè fert, eò quod circularis ipsi distorsio contingit, non angularis, sive in acutum.

Id ipsum tamen quoque intelligendum est de violentâ magis in angularem seu acutam figuram propulsione. Dari enim casus possunt, ubi, citra illam prægressam, id minus periculum infert. Ita ferulis teretibus, ligneis, cavis itidem spinam lumborum in acutum gibbum unâ aut alterâ vertebrâ prominentem in infantibus quinque, sex, septem mensium, quod sæpe contingit, aliquoties correxit *B. Rolsincius l. 4. epit. affect. part. c. 2. p. 381.*

Quoad *posteriolem*, ratione ESSENTIALITER INHÆRENTIUM, λόγδωσις omnium difficillimè curatur, imò ferè incurabilis est, ob inaccessiblei opem medicam, ut extrudi possint & exporrigi vertebræ. Post hanc αὐφθ à casu non facilè etiam cedere consuevit, nisi læsio fuerit levior & recens. σκολίωσις verò & σείσις cum primis facilius ferè auscultant medicæ arti. Omnibus verò commune est, quod non nisi recenti malo & imminente, nondum facto & confirmato, eoq; minori & in corpore adhuc molliori, cereo & succulento, ubi flexilis adhuc spina commodius

dius tractari & pro lubitu decenter flecti potest, æquè curabile sit malum; sed satis grave, tantoque gravius, quò magis à statu naturali, & *εὐφορία* naturæ facta est mutatio.

Quò magis itaque æqualis fuerit & pluribus vertebris communis distensio, eò levius & facilius curatu est malum judicandum, & contra. In lumbis si extiterit prominentia, facilius curatu est, imò quò magis versus inferiora declinat, eò etiam promptius cedit; quò magis versus superiora pectoris, eò difficilius, tum ob alias causas, tum quod ibidem commodior & constantior fieri potest deligatio & compressio, hinc verò minus.

In ESSENTIALITER CONSEQUENTIBUS, quò facilius fertur malum in respiratione, motu, incremento aliisque; eò etiam mitius est, & contra. Intuitu CAUSARUM, si malum fuerit hæreditariū, diu duraverit, & callum jam contraxerit, desperatum est. Ab externâ exortus gibbus curationem magis admittit, tanquam magis evidente & obviâ; non item ab internâ, nisi maturè obviameatur, per discutientia & roborantia.

Quoad TEMPUS EVENTUS, seu longitudinem & brevitatē, variat id ipsum pro læsionis gravitate, pectoris angustia majori vel minori, adeoque tolerantia & respiratione facili vel difficili. Hinc assertum Hippocraticum 6. *aphorism.* 46: Qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, moriuntur; non alio quàm hoc intuitu videtur intelligendum, quatenus producta sunt hæc duo à tuberculis latitantibus, eò progressis, ut suppurentur, & in bronchia pulmonum effundantur, unde vel suffocationem, vel phthisin post se trahunt, utramvis vitæ insidiantem maturè, idque ut plurimum. Confer *Galenum in Comment.* Neque opus est, quod *Severinus* contendit, ut in græco textu loco ἐξ legatur ἐξω, cum, quod sciamus, unanimis sit illa lectio.

Et sanè anni pubertatis de salute & morte in posterum definiunt ferè prognosin in gibbosis, quandoquidem vel incrementum tunc aliquod capiunt mutatione illâ solenni ætatis, quod eò usque dilatum fuerat, ut hinc ætatem reliquam facilius assequantur; vel sensim ad mortem fit transitus, exacerbatis symptomatibus. Hinc diuturnum est malum gibbus, ad plures annos du-

ἔτις & συναποθνήσκων, ita tamen, ut, præter dicta, etiam ἐυφρόως καὶ ὑγιενῶς, *facile ac sanorum more* degant maximè illi, quibus ad carnositatem ac pinguedinem promotum fuerit corpus. Pauci verò talium sexaginta annos superarunt, plerumque brevioris vitæ, teste *Coo l. de artic. c. 38. t. 5.*

Quin & omnis quæ sperari potest curatio, si σῆσιν exceperis in parvulis, lento & paulatino ferè gressu fit, non citâ manu.

MODUS EVENTUS ad salutem fit repositione vel perfectâ, vel quasi tali, ut saltem tolerabilius sit malum & ad naturalem modum magis pertingens, cavendo hoc ipso, ne nimis excre-
scat, majoremque deformitatem acquirat. Inferiorem finitam in nonnullis dysenteriâ & varicibus memorat *Hippocrates l. c. c. 37. t. 4.* Ad mortem suffocatione, asthma, phthisi, omnibus ferè pulmonum morbis expositis hisce ægris, nonnunquam & apoplexiâ, quod *D. D. Præsidi* visum est in juvene, terminari consuevit.

CAPUT IX.

Curationem in Genere cum methodo medendi & indicationibus delineat.

CUM Gibbus ex illorum morborum censu sit, ubi natura cedit arti, ejusque opem & auxiliares manus unicè exposcit, ad CURATIONEM devolvimur. Absolvitur hæc ipsa, ex MEDENDI METHODI regulis, indicationibus, morbis figuræ & situs aliis communibus, & indicatis seu materiis præsidiorum huic fini aptatis.

CURATORIA morbum ipsum respicit per repositionem, dæquationem & complanationem partis affectæ eminentis, ut figura naturali conformis, quantum omninò possibile est, consurgat, quorsum solitæ illæ luxatorum indicationes subordinatæ, extensio, repositio, deligatio & collocatio spectant. Ut enim videmus in vegetabilium genere, quæ curvitatem crescendo affectant, factâ ad rectos comites deligatione, inflexione blandâ vitium

tium corrigi; ita etiam in corpore se res habet. Totum enim & præcipuum artificium curandi gibbi in hoc consistit, ut extuberantia vertebrarum reprimatur retrorsum, seu in locum pristinum, alioquin omnia frustra tentantur.

PRÆSERVATORIA causas vel internas affluxu suo malum foventes, vel externas, morbum deteriorems indies reddentes, removet, & reposita firmare jubet.

VITALIS denique viribus subvenit, & symptomatibus urgentibus, atrophix, respirationi difficili & aliis occurrit.

MATERIÆ PRÆSIDIORUM ex Chirurgico, Pharmaceutico, & Diætetico fontibus desumuntur.

CAPUT X.

Fontem aperit Chirurgicum.

MAXIMA spes in CHIRURGIA sita est, quæ sola suppetias & genuinum juvamen ferre apta est, vel primariò saltem, reliquis ministrantibus, tum reverà, tum palliativè, prout conditio obvenientis mali variat. Cum ergò ἀεθρεμβόλω, seu reductione vertebrarum læsarum & contortarum in suum locum, opus sit, triplex etiam hîc modus usitatus locum obtinet: palæstrites, methodicus, & organicus, pro apparatu scilicet minori vel majori ita dictus, pro ratione subjectorum, malique majoris vel minoris accommodando.

Primus, PALÆSTRITES dictus, præ aliis est εὐπείης, solâ manûs COMPRESSIONE, vel EXTENSIONE propriè dictâ instituendus. Illa in tubere ipso & in plerisque gibbi speciebus, hæc in vicinis quoque locum habet; in λορδῶσι item & luxatione recenti leviori & graviori. Extensio hæc, quorsum & conjuncta concussio pertinet, maturè facienda, quod unicè proficit, in locum reducendis quoquo modo vertebris. Solent id & vulgò frequenter cum successu instituere in quassatione aliqualli vertebrarum, de quo consuli potest Sennertus l.c. qui modum vulgi describit, licet ad superstitionem sæpe & accusetur illa & curetur, præsertim in infantibus. Cum verò rarò statim

in ipso principio factæ læsionis extrinsecæ advocetur Medicus, ubi extensio primariò instituenda fuerit; factâ jam extuberantiâ, compressio in ejus locum cedit. Τα μὲν γὰρ ἐξέσσωτα, ἐς τὴν χώραν ἀναγκάζει καὶ ἡ ἱππώσις ἵεναι, *nam ea, que extant, ad locum suum redire cogit depressio.*

Modus nempe hic est: fotâ prius parte affectâ vel solo vino calefacto, vel cum nervinis mixto, ut cedere facilius & emolliiri partes ligamentosæ queant, sinistrâ manu sterno appositâ, dextrâ, interjecto linteamine, vel in pugnum conformatâ fit intrusio, continuo velut semicirculo per motum ejus facto, vel, quod *Hippocrates l. c. c. 45.* vult, impositâ manus volâ supra gibbum, & alterâ manu insuper alteri superimpositâ deorsum cogitur, habitâ ratione loci affecti & status p. n. diversi.

Et hæc coactio maximè innoxia & tuta est, cui affinis & altera, cujus meminere etiam laudati medicinæ procures, quando insidere vel pede inambulare gibbo jubent, quod tamen minus ferè usitatum est. Inde verò emplastris, unguentis, fotibus subjunctis, & ex fonte pharmaceutico repetendis, deligatio instituitur, quò magis magisque & intrò adigatur tumor, ut decet, & firmentur repositæ partes. Tali usus est *Epiphan. Ferdinand. hist. 84. p. 280. seqq.*

Ministrant hinc deligationi fasciæ, splenia & alia, in situ suo detinentia vertebrae affectas, adminicula. Et convenit maximè hæc operatio in tenellis & aliis personis, solaque ferè sufficit in σείσῃ, hinc & in reliquis, si cœtera consentiant; Præcipuè verò in lumbis, ubi fortius comprimere licet. Utiliter adhibetur eadem in σκολιώσῃ, in scapulæ & aliis lateralibus eminentiis, in sterni acuminatione ipsâ, redigens in ordinem thoracem.

In cervicis verò gibbere & λορδώσῃ extensio magis ministranda, quæ ipsa & conjuncta concussio etiam in reliquis in principio statim, recenti adhuc malo, spem restitutionis in integrum facit.

Alter METHODICUS modus eidem fini dicatus, sed mediis diversis, locum habet magis pro successivâ impulsione. Referemus huc primò FERULAS, quas teretes, cavas seu imbricatatas

catas adhibere consultum est, seu ligneas, quales *L. c. B. Rolfincius* utiliter adhibuit, seu æneas, quæ in *πολιώσῃ* sub axillis commodè gestantur, erigentes corpus & rectum tenentes. Sufficiunt illæ solâ cum deligatione in climate lumbari, cui paria faciunt etiam alibi, æquè ac ferulæ pro re natâ applicandæ, laminæ ferreæ plumbeæ, itidem imbricatæ, magnitudini gibbi conformatæ, aliaque spleniorum in modum compressioni velificantia. Sic M. Antoninus Imperator, cum esset longus & senex, adeoque exactâ ætate nimiam ob proceritatem incurvesceret, tiliaceis tabulis infasciabatur, ut rectus incederet, quod refert *Julius Capitolinus in ejus vitâ*. Vid. etiam *Scaliger lib. 1. de plantis p. 286.* qui thoracem, ait, tiliaceis assulis illum corrigere solitum, potius quàm aliis, proptereâ quod calore suo foverent senem. Ipse tamen non tam ob calorem expetitam ad Imperatoris fomentum tiliam addit, quàm quod mediocris est inter rigiditatem ac lentitudinem. Valet id quoque in *λογδῶσῃ* cum primis ipsâ.

Deinde in dorsali & thoracis regione eximius est THORAX, seu *coriaceus* uti ex cute humanâ, præcipuè ejus parte crassissimâ in dorso gestatum costas à gibbo distortas intra limites fidelissimè coercere asserit *Rolfinc. l. c. p. 381.* seu *lineus*, firmus tamen & ossibus seu setis balenarum interstinctus, ut firmetur rectitudo & erectum teneatur corpus; seu *ferreus* quoque, sive posticâ parte firmandus, si anticâ compressio magis requiratur, seu anticâ, si contrâ. Singuli hi iterum vel minoris vel majoris sunt apparatus, qui posteriores ad tertium magis modum referendi.

Notabile tamen est: 1. thoracem talismodi magis convenire emollitis prius cartilaginibus & ligamentis;

2. Obduci posse commodè corio, & leviores cum sint laminæ, per se gestari, vel quoque, quò leviores sint & perspirabiles magis, multis & crebris foraminulis pertusæ, corpori aptæ;

3. Continuandum esse usum thoracis hujus per benè multum tempus, donec imbecillitas membrorum & mollities plenariè cessaverit;

4. Pro corporis incrementis & mali remittentis modulo novum fabricari & aptari posse, exactis aliquot mensibus;

5. Constrictione interim probè factâ, ad ἐνθουσιασµὸν tamen, & juncto, si opus fuerit, pro extensione cervicis, in thorace posticè firmato, capitis elevatorio, gradibus additis, pro majori vel minori intensione vel remissione variandis.

6. Thoraces hi in iis magis usum habent, qui incrementi adhuc magis sunt compotes, qui enim incrementi sui modum, maximam partem acquisiverunt, minus ab iis ipsis quoque juvantur, nisi forsan, ut firmetur magis debilior ossium crates, suadendi illi & tunc videantur. Confer *Hildan. cent. 5. observ. 67. pag. 458. Paræum l. 22. c. 8.* qui thoraces tales depingit, & alios.

Pertinet huc quoque ὀπλομόχλιον *Fabritii ab Aquapendente*, cujus icon anticâ & posticâ parte videnda in operibus ejusdem depicta visitur. Consulendus etiam seorsim *idem pag. 187. operat. chirurg.*

Porrò huc etiam pertinet SUSPENSIO artificialis, quando firmatum sub axillis corpus, capite sub mento seorsim fasciâ excepto, ansisq; geminis aptatis manibus, libero in aëre libratur agiturve corpus pendulum, unâ alteraque horâ de die, ut hoc pacto pondere suomet extendat & exporrigat curvaturam, id quod non minus, ac reliqua plura, cum primis succedit ex voto quando inferius paulò declinat gibbus, non æquè quando superiori loco residet. Meminit hujus etiam *Mayow. l. c. p. 148.* Cujus succedaneum est, si capite manibus utrinque prehensio sustollatur corpus per vices.

Tertius denique MECHANICUS compressionem extensionemq; expetitam absolvit, vel intendit potius, scalarum, scamnorum, torcularium comprimentium & laqueorum beneficio, de quibus *Hippocrates, Galenus, Oribasius* aliiq; legi possunt. Memorandum hîc quoque est instrumentum mechanicum, quo aurigæ utuntur ad attollendas rotas & ponderosiora, cujus mediante impulsu gibbositatem curatam refert *River. obs. commun. p. 668.*

Genuinum tamen & probè attendendum monitum est Hippocraticum aureo libro de articul. c. 39. t. 1. parum sæpè his effici extensionibus, adde & compressionibus, quin sæpè optimum remedium est, graviori malo & frustra tentatis reliquis, remedio

non

non uti, nisi nempe in principio statim adhibeantur, prius, quam callo obducto, vel ossibus etiam coalitis penitus, malum desperatum sit. Ita luxationem ipsam vertebrarum dorsi introrsum factam hoc modo curatam legere licet *Ann. 4. Ephemer. Germ. obs. 77. p. 64.*

Pertinet huc extremum illud spinæ reponendæ, in λοξώσῃ puta, remedium, quod præviis incisionibus manu in ventrem injectâ perficitur, ex internâ parte ad externam manu factâ retrusione, quod mirum est *Hildanum*, tam insignem Chirurgum, *centur. 5. observ. 69. p. 460.* admittere & commendare, imò tenacula manus loco adhibere velle, quod latius ibidem videri potest, cum tamen *divinus Senex l. c. c. 43. t. 6.* id in mortuo quidem fieri posse, in vivo autem non item, expressis verbis edixerit. Quin visus fuit aliquando abscessus in dorso ortus, spontaneo naturæ conatu, citra tamen mali ablationem.

Hæc verò proposita hæcenus ut propria quasi sunt parti hîc affectæ; ita communia præsidia chirurgica huc arcessi quoque possunt, si eadem indicata ex usu esse videantur, quod tamen rarius paulò fit. Ita VENÆSECTIO non habet locum, nisi forsân lapsu vel ictu graviore facto statim in principio ad revulsionem.

Sin affluxus feri major & copiosior ad spinam dorsalem fiat, consentientibus reliquis, cauterium potentiale vel fonticulus admoveri potest, quale exemplum recenset *Poterius cent. 2. observ. c. 38. p. 136.*

CAPUT XI.

Ex fonte pharmaceutico remedia proponit.

CUM Chirurgia ipsa ex fonte pharmaceutico sibi mutuatur remedia, etiam ad gibberis curationem, tum ipsa PHARMACIA non minimum de suo addit momentum, potissimum si ab internâ causâ ortum suum trahat, si cacochymia conjuncta eundem foveat, si laticis vitium sit extantius, quæ præsidia ordine brevî videbimus.

Ex

Ex UNIVERSALIUM penu LENIENTIA ferofiore & laxiorem habitum corporis, educis è primis viis quisquiliis, omninò respiciunt, ipsaque pro re natâ propriè dicta PURGANTIA. Notum quippe est, non solùm optimè ferre purgantia infantes, contra ac nonnullis visum est; verùm etiam non minus ac alias ætates admittere, imò opus habere iisdem, & indicare, siquidem ob *ἀδὲν φάγια* faciliè cumulant recrementa, & corpus infarciendo vitia in nutritione & auctione accersunt. Tacemus maturè sese exerere salium scorbuticorum vel hæreditariam labem, unde expurgari postulant corpora nonnunquam, & ut præserventur à morbis, & ut facilius curentur gibberis fientis vitia.

Notabile quin etiam est, in abscessibus internis latitantibus sæpenumerò purgantium insignem fuisse virtutem observatam. Cavendum solùm, ne hypercatharsin patiantur tenella corpora, & hinc exhausto & depauperato nutritio succo nutare occipiant corporis sustentacula, partes ossæ, robur omne suum à spinâ dorsi velut basi quâdam derivantes.

Hunc in finem dari possunt feligenda & individuâ aptanda purgantia ex *gialapâ*, *mechoacannâ albâ*, *mannâ*, *rhabarbaro*, *aloe*, *senâ Alex.* & ex in præparatis, *sir. ros. solut. de cich. c. rhab. elect. lenit. resin. scammon.* aliisque abundè notis.

Præter hæc, ut potiora saltim libemus, plurimum opis situm est in usu DIAPHORETICORUM. Cum enim hæc ipsa omnem *σύν* feri & sanguinis, ubi ubi fientem & factam, disjiciant, affluxum arceant, & circulum humorum vitalium in ordinem redigant, merito suo à *Severino l. c. c. 4 p. 351.* habentur præcipuum & primarium ad morbi hujus causas aut eximendas & minuendas. Laudari hunc in finem merentur $\frac{1}{2}$ *diaph. C.C. phil. bez. Al. cachect. ens* $\frac{1}{2}$ *Boylei*, seu *flor. ☉ & ☿ ☽*, seu ex terrâ \oplus *li dulci* \ominus *mati, M.S. ~ ☿ ri, Ra bez.* Exterioris verò æstuariorum, balnea laconica, tepidaria, thermæ, ad tolerantiam habitus corporis, ætatis, naturæ instituenda.

Par ratio est DIURETICORUM, quæ aperiendi & resolvendi virtute serum superfluum partim imminuunt, partim in ordinem cogunt, ex *succin. alb. ppt. magist. oc. ☿*, *arcan. duplic.* cujus

cujus insignis vis in atrophîâ ab obstructione glandularum mesentericarum, si à martialibus abierimus, accuratioribus practi-
cis dudum notata est; *arcano* ♀ri & similibus.

ALTERANTIA specifica interna licet non adeò prostant,
vel ad gibberis curationem venditen ur; summo tamen jure huc
referri possunt & pro his haberi (1.) RESOLVENTIA ex lap. ☿.
☿ diaph. sperm. cet. matr. perlar ppt. pulv. absorbente Wedel. pulv.
contr. casum, cerefolio, scabiosa, cinnabari nativâ, quod divinum
ad omnia seri stagnantis vitia remedium laudes omnes superat,
& aliis. Non sine causâ etiam horum censum subeunt laudata
jam diaphoretica & anodyna ipsa, singula uni eidemque inten-
tioni debita.

(2.) APERIENTIA, quorum nomine complectimur, quæ
glandulas intestinales obstructas reserant, amurcam venarum
extergunt, humores acetosos saturant, edulcant, absorbent,
quin & diluendo temperant, sicubi deficiat humor debitus. Talia
cum primis martialia esse queunt, quæ instar omnium sunt, mo-
dò humectantia & roborantia in sicciori statu magis eligantur,
ut Ra ♂ pomata, cydoniata, Stis Oris cum arcano ♀ri tincta, Stis
balsamica, Zwelfferi; essentia ♂ii ♀risata, anima rhabarbari,
elixir antiscorbuticum, ut alia antiscorbutica taceamus.

(3.) NERVINA & CEPHALICA, illa præcipuè quæ &
vincula roborant balsamicâ virtute, & seri ichorescentiam &
fluxilitatem peregrinam salinam corrigunt, ex chamædr. cha-
mæpit. rosmar. salv. major. stæchad. arab. castor. rad. chin. sarsapa-
rill. essent. succin. lignor. specif. cephal. cinnabarino, pulv. epil.
March. & similibus.

(4.) TRAUMATICA, quæ characterem suum alcalinum
vel balsamicum sanguineæ massæ, & latici præcipuè impertiunt,
ut impedimentis γλιχρότητι ☿ convenientis ablatis, solidescere
magis in cartilaginosa & osseam duritiem possit; ut deco-
cta, aquæ ☿ infusa ex plantis vulnerariis, facile cum solventibus
& nervinis miscendis, essent. traumat. Rolf. Wedel. quæ omne
absolvit punctum, seu per se, seu cum Ra bez. elix. pector. essent.
succin. anod. prout indicantia variant, miscenda; ut lapides ☿,

illorumq; infusum vel decoctum cum vino non denuò laudemus.

Inter roborantia hæc (5.) reponi merentur & PECTORALIA, tussi, respirationi difficili, phthisi, seu mitigandis, seu præservandis, appropriata, non omissis, quæ calorem hecticum, si quis obrepat, attendunt. Hinc *pulv. pector. D.D. Præs. uterq; elix. pector. ejusd. spec. diamarg. fr. pulv. Haly contra phthisin rec. disp.* hîc nominari merentur. Quin imò ipsa quoque pinguedo canina recens jusculis non inutiliter inferri potest, ad oleosiorum reddendum laticem.

Tandem & ALTERANTIA EXTERNA seu TOPICA recensenda veniunt, quæ vi traumaticâ, nervinâ, analepticâ, emolliente, vel roborante sunt conspicua. Sic fieri possunt FORUS ex cephalicis & roborantibus cum vino vel \forall infusis & digestis; ex *aq. anhaltina, essent. rosmar. castor. ejusque spiritu, lumbric. junip. &c.* UNGVENTA ex \odot *momord. laurino, lumbric. lil. alb. ophiogloss. euphorb. n.m. petrol. medull. crur. vitul. sev. kircin. pingu. human. taxi, unguent. dialth. agripp. martiat. nervin. popul. resumptiv.* additis quoque oleis destillatis pro lubitu. Sunt qui pinguedinem anseris, muribus juvenibus pluribus impleti & aflat, pro secreto remedio habent. Quod tamen præstat, sine dubio arcescendum est ab emolliendi virtute, cum aliis communi. Compositum tale unguentum ad gibbositatem infantum describit *Strobelberg. tr. de aff. puer. p. 61.* EMPLASTRA ex cerato citrino, *sandal. empl. ad fracturas & ruptur. usit. oxycroc. emplastr. ad gibber. Hildan. descripto cent. 5. observat. 67. pag. 458. de rad. althææ, opoteldoch. Rolf. &c.* additis adstringentibus, roborantibus & discutientibus, *pulv. lumbric. terr. g. tacamah. carrann. &c.* Tale quoque est à *Foresto* commendatum *l. 29. obs. 23. in schol. p. 824.* simplicius quidem ex *gummi *co & ladano*, pro pueris, & compositum magis, si desideretur.

Ex his verò non difficile fuerit medico rationali & experto seligere pro causarum & subjectorum diversitate, quod magis ex usu putet. Alia enim ratio est sicciorum, alia laxiorum vinculorum habenda, unde & emollientia & adstringentia, sed diverso tempore & respectu profunt, cujus rei exemplum videri potest apud *Amat. Lusit. cent. 5. cur. 47. p. 143.*

CAPUT XII.

Diætæ rationem annexit.

Feliciores tandem curationem præstat victus ratio, seu vivendi regimen; **DIÆTA**, quæ in genere ita comparata esse debet, ut ætatis & corporis temperiei sit conveniens.

In **NATURALI CIBUS** præbeatur *εύχολος καὶ πλύτος* *Φος*, inprimis si siccitas conjuncta sit major & aridura. Vitentur verò nimis viscosa, salita, infumata, frixa, aromatisata, obstructionibus generandis vel rarefaciendo sanguini magis apta.

POTUS sit cerevisia defecata; recens & vetusta nimis noxia. Vinum parcâ præbeatur manu, inprimis generosum.

In **VITALI AER** eligendus temperatus. Frigidus cum nervosis partibus inimicus sit, & tussi ac catarrhis generandis aptior, à corpore arceatur. Nocet verò & calidus nimis, sanguinem ad motum magis ciens ac sudorem.

In **ANIMALI QUIES** cordi habeatur præ motu. Infirma illa corpora omnia lassantur & læduntur motu, qui jamdum difficilis succedit, & respirationem adauget magis.

SOMNUS cum humectet, & humidum, quo nutrimur, magis ad lentorem debitum disponat, convenit præ **VIGILIIS**. Opus sæpe est & de die & noctu simul gestare thoraces & ligamenta, ut constantius & reprimantur & reposita firmentur ex ordine dimota. Supinus decubitus, capite tamen paulò acclivè, hîc reliquis modis ferè præferendus. Vitandæ & in lecto, quas vocant, jectigationes.

ALVUS & VESICA recrementosas spissas & tenues alimentorum partes justo reddant tempore, ne desidiâ vel exiccatione nimia indurata scybala conatum in egerendo majorem inferant, unâque ossibus laborem fœnerent.

ANIMI PATHEMATA ad rationis justæ normam moderari fas est. Gaudium moderatum infantum & crescentium ætatum reliquarum temperiei est aptissimum. Ira, terror, metus & tristitia, quæ exiccant ossa, absint. Lachrymandi & plorandi occasiones, quantum licet, vitentur.

SOLI DEO GLORIA.

UT rectum obliqui, sic recti est regula curvum ;
 Utrumque ex alio noscere rite datur.
 De curvo Tua dum disquiris gibbere musa,
 currere Te recto tramite, testis ero.
 Maeste Tuis ausis, non hoc lassare labore,
 morborum artificem digna corona manet.

*Pereximio Dn. Respondenti, peoniam scandenti cathedram,
 felices apprecor studiorum successus*

P R Æ S E S.

MOntis per juga tendis, ingenique
 vis cursum properat, volantis instar
 flammæ. Nunc caput, ut cupressus, effert,
 gibbosusque petit polum : per aspra
 ad laudes. Oculis patet subindè
 portus. Perge: nec abstine, priusquam
 ad summum venias. Apollo noster
 Laurum porriget, & Novena turba
 mox gratans studii feret coronam,
 virtutis comitem, tuâque dignam.

*Nob. & Humaniss. Dn. Respondenti, Amico & Auditori suo per-
 industrio, de specimine Academico hoc ex animo grat.*

Augustinus Henricus Faschius, D. P. P.

Materiam raram tractas de gibbere doctè,
 Apprecor, hinc surgat laus quoque clara Tibi.

Hoc pauxillum ὀλοψύχως effundebat

M. Johann. Weise / Phil. Adj.

Quid rectum & curvum hoc evoluit Jure peritus
 Et Medicus. Quæris : Sidere sed parili?
 Quidni : Namque illi dat Justinianus honores,
 Et Tibi Galenus, crede mihi, dat opes.

*Invita licet Minerva Clarissimi Dn. Auctoris Respondentis, Fau-
 toris atque Amici sui, specimini egregio applaudere debuit*

M. Jo. Andr. Schmidt / Adj.

F I N I S.